

Vragen contra-indicaties COVID-19-vaccin voor de huisarts

Al COVID-19-vaccinatie ontvangen

nee ja

Zo ja: afzien van vaccineren.

Koorts

nee ja

Zo ja: bij een temperatuur van 38,5 °C of hoger wordt de vaccinatie uitgesteld.

Anafylaxie in het verleden

nee ja

Zo ja: 30 minuten observatie na vaccinatie

Ernstige allergie voor een van de bestanddelen (zie einde van dit document) van het vaccin

nee ja

Zo ja: afzien van vaccinatie (absolute contra-indicatie)

Antistolling

nee ja

Zo ja: altijd na vaccinatie 2 minuten stevig afdrukken zonder te wrijven, en daarnaast:

Cumarinederivaat

nee ja

Zo ja: controleren op stabiele instelling door de trombosedienst vooraf aan de vaccinatie.

DOAC

nee ja

Zo ja: stem tijdstip vaccinatie af op de inname → bij voorkeur minimaal 12 uur na inname maar in ieder geval 6 uur na inname. In geval van vaccineren binnen 6 uur na inname 10 i.p.v. 2 minuten afdrukken. Praktisch: ochtenddosering overslaan, eventueel inhalen op een later moment mits voldoende tijd tussen de ochtend- en avonddosering.

Bloedingsneiging

Overleg met behandelend specialist voor mogelijkheid i.m. toediening bij:

- Aangeboren stollingsstoornis; hemofilie, ziekte van Von Willebrand
- Trombopathie of trombopenie (aantal < 50 x 10⁹/l)

Zwangerschap

nee ja Zo ja: vaccineren voordelen van vaccineren afwegen tegen de nadelen (meer informatie leest u op de webpagina contra-indicaties)

Okselklier verwijdering

nee ja

Zo ja: vaccineren aan de andere zijde

Epilepsie bij koorts of na vaccinatie

nee ja

Zo ja: nagaan of vaccinatie een aanval uit kan lokken en of de voordelen van vaccinatie opwegen tegen het eventueel krijgen van een epileptisch insult bij koorts of na vaccinatie

Operatie met anesthesie gepland

nee ja

Zo ja: als minimaal interval tussen vaccinatie en anesthesie wordt 48 uur aangehouden.

COVID-19 doorgemaakt

nee ja

Zo ja: < dan 4 weken geleden positief getest of start verschijnselen? Dan uitstel vaccinatie.

Zo ja en opgenomen geweest in ziekenhuis en behandeld met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen: uitstel vaccinatie tot 2-3 maanden na toediening.

Kwetsbaarheid

Is de patiënt zo kwetsbaar dat koorts een reële kans geeft op overlijden? Dan voor- en nadelen van vaccinatie tegen elkaar afwegen.

Bestanddelen Moderna-vaccin

- Lipid SM-102
- Cholesterol
- 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
- 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)
- Tromethamol
- Tromethamol hydrochloride
- Acetic acid
- Sodium acetate trihydrate
- Sucrose
- Water voor injectie

Bestanddelen AstraZeneca-vaccin

- L-Histidine
- L-Histidine hydrochloride monohydrate
- Magnesium chloride hexahydrate
- Polysorbate 80 (E 433)
- Ethanol
- Sucrose
- Sodium chloride
- Disodium edetate (dihydrate)
- Water voor injectie